

Contactez-nous

CISSS Bas-Saint-Laurent

<https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca>

et

CISSS de la Gaspésie

<https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca>


Prévenir
Accompagner
Prendre soin

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

Québec 

Statut : Approuvé 2024-12-05
OPTI-DE-017 v2

Instructions à l'utilisateur

Schistosomiase urinaire

Département clinique de médecine de laboratoire

OPTI-DE-017



Votre médecin vous a prescrit un test pour lequel vous devez faire la collecte d'une miction d'urine, en vue d'identifier les œufs du parasite urinaire, responsable de la Schistosomiase.

La mise en évidence des œufs est effectuée par l'examen direct de votre urine par microscope.

Ce dépliant explique les étapes à suivre.

Prendre les informations pour le prélèvement à votre centre de prélèvement en centre hospitalier.

MATÉRIEL REQUIS

- Contenant stérile



Québec 

CONSIGNES À RESPECTER

- L'exercice physique prémictionnel permet de rendre optimal votre prélèvement.
- La totalité de l'urine doit être récoltée.

Risque de contamination par contact transcutané; manipuler avec précaution (même lorsque fixé).

IDENTIFICATION DU SPÉCIMEN

Si le contenant n'est pas déjà identifié, inscrivez **lisiblement** les renseignements suivants sur l'étiquette du contenant :

- Votre nom et prénom;
- Numéro de référence personnalisé: numéro de dossier de l'établissement ou NAM (numéro d'assurance maladie).
- La date et heure du prélèvement

CONSERVATION

- Le spécimen est récupéré par le personnel de la salle de prélèvement, immédiatement après la récolte. **Le port des gants est obligatoire pour le personnel qui récolte l'échantillon.**

RETOUR DES ÉCHANTILLONS

- N'oubliez pas de vous présenter avec **votre carte d'hôpital, ou RAMQ** et ayez en main **votre prescription, si nécessaire** lors du retour des échantillons.



ÉTAPES À SUIVRE :

1. Faire une vingtaine de minutes d'exercices physiques prémictionnelle (monter et descendre des escaliers, sautilllements) afin de faire décoller les œufs qui adhèrent aux parois de la vessie.
2. Se laver les mains à l'eau et au savon;
3. Ouvrir le contenant et déposer le couvercle coté intérieur vers le haut en évitant de toucher l'intérieur du couvercle.
4. Recueillir la totalité de votre urine dans le contenant stérile.
5. Remettez le couvercle et fermez-le bien.
6. Lavez-vous les mains.

