

Contactez-nous

CISSS Bas-Saint-Laurent
<https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca>

et

CISSS de la Gaspésie
<https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca>


Prévenir
Accompagner
Prendre soin

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

Québec 

DÉTECTION D'HELICOBACTER PYLORI

Test respiratoire à l'urée (détection par carbone 13)

Département clinique de médecine de laboratoire

OPTI-DE-023



Votre médecin vous demande de passer un test respiratoire à l'urée afin de vérifier l'état de santé de votre estomac. Ce test respiratoire à l'urée permet de vérifier la présence de *Helicobacter pylori* dans votre estomac.

Ce test est effectué en Centre hospitalier seulement et consiste à recueillir dans un tube spécial des échantillons d'air expirés avant et 30 minutes après avoir bu une boisson spécifique.


Le test consiste ensuite à mesurer la concentration de carbone (C¹³) dans les échantillons.

Statut : Approuvé 2024-12-06:
OPTI-DE-023
Source des images : Pixabay et Innovation-FR

Québec 

Consignes à respecter

- Être à jeun pendant **au moins 3 heures**. Vous ne devez ni manger, ni boire même pas de l'eau.
- Vous ne devez pas avoir pris certains médicaments :
 - ✓ **Depuis au moins 24 heures** : les antiacides, par exemple *Maalox*, *Gaviscon*, *Pepcid*, *Tums*, *Axid* ou *Tagamet*.
 - ✓ **Depuis 14 jours** : les médicaments de type inhibiteur de pompe à protons :
 - * *Oméprazol* (*Losec* ou autres marques)
 - * *Lansoprazole* (*Prevacid* ou autres marques)
 - * *Éséméprazole* (*Nexium* ou *Apo-esoméprazole*)
 - * *Pantrazole* (*Pantaloc*, *Tecta* ou autres marques)
 - * *Rabérazole* (*Pariet* ou autres marques)
 - * *Dexlansoprazole* (*Dexilant*)
 - ✓ **Depuis 4 semaines** : des antibiotiques ou du *Pepto-Bismol*.



Méthode de prélèvement

Durée du test

Le test est d'une durée d'environ 45 minutes.

Déroulement du test

- 1) Vous allez boire une boisson au goût citronné à base d'acide citrique.
- 2) Vous soufflerez avec une paille dans deux tubes conçus pour recueillir l'air expiré.
- 3) Vous allez boire une seconde boisson citronnée contenant de l'urée.
- 4) Après 30 minutes d'attente, vous soufflerez à nouveau avec une paille dans deux tubes.

ATTENTION : Durant toute la durée du test, vous devrez rester au repos. Vous ne pourrez ni boire, ni manger, ni fumer.

